

## Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys. **Novalac 1** ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

## ANWENDUNG

**Novalac 1** ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen von der Geburt an bis zum 6. Monat, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.

## DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6-7	5
Anzahl Messlöffel	3-4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90-120	120

2-3	3-4	4-5	5-6
6	6,5	7	7,5
5	5	4	4
4-5	6	6-7	6-7
120-150	180	180-210	180-210

Standardauflösung:  
13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser  
= 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac 1**

## WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

**Novalac 1** kann vom 1. Fläschchen bis zum 6. Monat als alleinige Nahrung gegeben werden, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Für Babys ab dem 6. Monat steht Ihnen **Novalac 2** Folgemilch zur Verfügung.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Ein Produkt von **Laboratoires Novalac SA**  
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876  
1215 Genf – Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**  
Horbeller Straße 11, D-50858 Köln  
www.novalac.de

e 800 g



Unter Schutzatmosphäre verpackt

# Novalac

## Säuglingsmilchnahrung



1

0-6 Monate

800 g

## ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100kcal
<b>Energie</b>	kcal 505,3	65,7	100
	kJ 2115,7	275	418,7
<b>Fett</b> davon	g 25,5	3,3	5
- gesättigt	g 12,4	1,6	2,5
- einfach ungesättigt	g 6,5	0,8	1,3
- mehrfach ungesättigt	g 5,3	0,7	1
<b>Kohlenhydrate</b> davon	g 57,8	7,5	11,4
- Zucker	g 41,1	5,3	8,1
<b>Eiweiß</b>	g 11	1,4	2,2
<b>Natrium</b>	g/mg 0,375/150	0,05/19,5	0,07/29,7

### Mineralstoffe

Kalium	mg 470	61,1	93
Chlorid	mg 300	39	59,4
Calcium	mg 380	49,4	75,2
Phosphor	mg 230	29,9	45,5
Magnesium	mg 45	5,9	8,9
Eisen	mg 6	0,8	1,2
Zink	mg 4,5	0,6	0,9
Jod	µg 65	8,5	12,9
Kupfer	µg 400	52	79,2
Mangan	µg 35	4,6	6,9
Selen	µg 10	1,3	2
Fluorid	µg <450	<59	<90

### Vitamine

A	µg RE 450	58,5	89,1
B1	µg 400	52	79,2
B2	µg 800	104	158,3
B6	µg 300	39	59,4
B12	µg 1,5	0,2	0,3
C	mg 60	7,8	11,9
D3	µg 7,5	1	1,5
E	mg α-TE 12,8	1,7	2,5
K1	µg 30	3,9	5,9
Niacin	mg 4,5	0,6	0,9
Pantothensäure	mg 2,4	0,3	0,5
Folsäure	µg 60	7,8	11,9
Biotin	µg 15	2	3
Cholin	mg 100	13	19,8
Inositol	mg 45	5,9	8,9
Taurin	mg 44	5,7	8,7
L-Carnitin	mg 8	1	1,6

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)  
www.novalac.de

## ZUTATEN

Magermilchpulver, Milchproteine\*, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Maltodextrin, Tricalciumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Vitamine (A, B1, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Tocopherolreicher Extrakt), Magnesiumoxid, Natriumselenit, Kupfersulfat, L-Carnitin, Kaliumjodid, Mangansulfat, Cholinbitartrat, Dinatriumphosphat, Inositol.

\* Die Proteinquelle in **Novalac 1** ist Kuhmilch.

## ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.



1 Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlenstoffarmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.



2 Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.



3 Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.



4 Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.