

Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys. **Novalac 2** ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

ANWENDUNG

Novalac 2 ist eine Folge-Milchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab dem 6. Monat, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	>6
Säuglingsgewicht (kg)	>7,5
Anzahl Fläschchen pro Tag	3*
Anzahl Messlöffel	7
Abgekochtes Wasser (ml)	210

*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme

Standardauflösung:
13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser
= 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac 2**

Eine Flasche **Novalac 2** enthält Calcium und Vitamin D für normales Wachstum und Entwicklung der Knochen.

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Bitte verwenden Sie **Novalac 2** nicht als Muttermilchersatz in den ersten fünf Monaten. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen. Ab dem 6. Lebensmonat sollten Sie die Ernährung Ihres Babys nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt schrittweise erweitern und ausbauen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Ein Produkt von **Laboratoires Novalac SA**
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876
1215 Genf – Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**
Horbeller Straße 11, D-50858 Köln
www.novalac.de

e 800 g



Unter Schutzatmosphäre verpackt

Novalac

Folge-Milchnahrung



2

Nach dem 6. Monat

800 g

ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100 kcal
Energie	kJ 2075,2	269,8	419,2
	kcal 495	64,4	100
Fett davon	g 23	3	4,6
- gesättigt	g 11,1	1,4	2,2
- einfach ungesättigt	g 5,9	0,8	1,2
- mehrfach ungesättigt	g 4,8	0,6	1
Kohlenhydrate davon	g 61	7,9	12,3
- Zucker	g 42,1	5,5	8,5
Eiweiß	g 11	1,4	2,2
Natrium	g/mg 0,375/150	0,05/19,5	0,08/30,3

Vitamine

A	µg RE	450	58,5	90,9
B1	µg	400	52	80,8
B2	µg	800	104	161,6
B6	µg	300	39	60,6
B12	µg	1,5	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	12,1
D3	µg	8,1	1,1	1,6
E	mg α-TE	8,7	1,1	1,8
K1	µg	30	3,9	6,1
Niacin	mg	4,5	0,6	0,9
Pantothensäure	mg	2,4	0,3	0,5
Folsäure	µg	60	7,8	12,1
Biotin	µg	15	2	3

Mineralstoffe

Kalium	mg	620	80,6	125,2
Chlorid	mg	415	54	83,8
Calcium	mg	635	82,6	128,3
Phosphor	mg	360	46,8	72,7
Magnesium	mg	45	5,9	9,1
Eisen	mg	6	0,8	1,2
Zink	mg	4,5	0,6	0,9
Jod	µg	95	12,4	19,2
Kupfer	µg	400	52	80,8
Mangan	µg	35	4,6	7,1
Selen	µg	10	1,3	2
Fluorid	µg	<450	<59	<91
Cholin	mg	60	7,8	12,1

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)
www.novalac.de

ZUTATEN

Magermilchpulver, Maltodextrin, Lactose (Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Calciumcarbonate, Emulgator (Sojalecithin), Calciumchlorid, Tricalciumphosphat, Vitamine (A, B1, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Eisensulfat, L-Tryptophan, Trikaliumcitrat, Magnesiumoxid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Tocopherolreicher Extrakt), Kupfersulfat, Natriumselenit, Kaliumiodid, Mangansulfat.

ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.



Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlenensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.



Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäuft – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.



Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.



Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.